

# Grifociprox<sup>®</sup>

## Ciprofloxacino 500 mg

### COMPOSICIÓN:

Cada comprimido recubierto contiene:  
Ciprofloxacino Clorhidrato  
Eq. a Ciprofloxacino.....500 mg

Excipientes: Celulosa microcristalina, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, talco purificado, almidón glicolato de sodio, hipromelosa E5, dióxido de titanio, macrogol 6000, etilcelulosa, colorante D&C amarillo N° 10, laca.

### CLASIFICACIÓN:

Antibacteriano sintético de amplio espectro.

### MODO DE ACCIÓN Y PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:

Ciprofloxacino es bactericida en cepas susceptibles en concentraciones cercanas a su Concentración Inhibitoria Mínima (MIC). El principal modo de acción de Ciprofloxacino es inhibición de la DNA girasa (topoisomerasa II) el cual es mediador de la formación de la hélice de DNA. Ciprofloxacino posee actividad in vitro contra un amplio rango de microorganismos gram (+) y gram (-). También ha mostrado ser activa contra una serie de microorganismos, in vitro y en infecciones clínicas.

### INDICACIONES:

Tratamiento en adultos de infecciones del tracto respiratorio, tracto urinario, prostatitis crónica, piel y su estructura y de infecciones de huesos y articulaciones producidas por bacterias gram-positivas y gram-negativas susceptibles.

### DOSIS Y MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN:

El médico debe indicar la posología y tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es: La dosis usual para pacientes con infecciones del tracto urinario suave a moderado es de 250 mg cada 12 horas. Para pacientes con infecciones complicadas o severas causada por organismos no altamente susceptibles, puede administrarse 500 mg cada 12 horas. Infecciones del tracto respiratorio bajo, infecciones de la piel y de sus estructuras, infecciones de los huesos y coyunturas pueden ser tratados con 500 mg cada 12 horas.

Para infecciones más severas o complicadas la dosis es de 750 mg cada 12 horas. Para el tratamiento de infecciones gonocócica uretral o cervical aguda, no complicada, la dosis recomendada es una dosis única de 250 mg. La determinación de la dosis para un paciente particular debe considerar la severidad y naturaleza de la infección, la susceptibilidad del organismo causante, la integridad de los mecanismos de defensa del paciente, y el estado de la función hepática y renal. La duración del tratamiento depende de la severidad de la infección. Es imprescindible continuar el tratamiento con Ciprofloxacino por al menos 3 días después de que los signos y síntomas han desaparecido. La Duración habitual es de 7 a 14 días. La diarrea ser tratada por 5-7 días. La fiebre tifoidea debe ser tratada por 10 días.

### Niños

Se puede administrar Ciprofloxacino en niños con edad entre 5-17 años que padecen de exacerbación pulmonar aguda por P. aeruginosa en fibrosis quística, con una dosis oral de 20 mg/kg/12 h por 10-14 días.

Carbunco, Profilaxis tras exposición sospechada o confirmada a B. anthracis, la dosis en niños con edad entre 5-17 años es de 10-15 mg/kg/12 h, administrado por 60 días.

Tome Ciprofloxacino exactamente como lo indique el médico. Si no entiende estas instrucciones, pídale al médico, enfermera, o farmacéutico que se las explique.

Tome cada dosis con un vaso de agua lleno. Para impedir la formación de cristales de Ciprofloxacino en la orina, tome bastante líquido cada día.

No muela, rompa, o mastique los comprimidos. Tráguelos enteros. Ciprofloxacino puede tomarse con o sin alimentos. Es preferible tomar Ciprofloxacino 2 horas después de una comida.

No tome Ciprofloxacino con producto lácteos (como leche o yogur) o jugos fortificados con calcio pues la eficacia de la medicina puede reducirse.

Tome Ciprofloxacino a intervalos espaciados uniformemente.

No tome antiácidos que contienen calcio, magnesio o aluminio, sucralfato o los suplementos vitamínicos o de minerales que contienen hierro o zinc por un mínimo de 6 horas antes o 2 horas después de la dosis de Ciprofloxacino. Los efectos del antibiótico pueden ser reducidos grandemente si Ciprofloxacino se toma muy cerca al antiácido, sucralfato, o los suplementos vitamínicos o de minerales.

Tome toda la Ciprofloxacino que le hayan recetado aun cuando empiece a sentirse mejor. Sus síntomas podrían empeorar a mejorar antes de que la infección esté completamente curada.

### Si usted olvida una dosis:

En cuanto se acuerde, tome la dosis olvidada. Sin embargo, si ya es casi la hora para su próxima dosis, espere y tome solamente la próxima dosis regularmente fijada. No tome doble dosis de este medicamento, a menos que sea indicado de lo contrario por su médico.

### REACCIONES ADVERSAS:

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Cualquier medicamento puede producir efectos no deseados especialmente si se toma por un período prolongado de tiempo en grandes dosis. Si nota cualquiera de los siguientes efectos secundarios de gravedad, deje de tomar Ciprofloxacino y busque atención médica de emergencia o comuníquese con su médico de inmediato:

Reacción alérgica (dificultad para respirar; cierre de la garganta; hinchazón de sus labios, lengua, o cara; o ronchas);

Convulsiones

Confusión y alucinaciones;

Daño del hígado (piel u ojos amarillos, náuseas, dolor o malestar abdominal, pérdida de sangre o moretones fuera de lo normal, mucho cansancio); o Dolor en los músculos o las articulaciones. Sarpullido.

Si nota cualquiera de los siguientes efectos secundarios de menor gravedad, siga tomando Ciprofloxacino y consulte a su médico: Náuseas, vómito, diarrea; Dolor de cabeza; Mareos o vahidos; Somnolencia; Insomnio; Zumbido en sus oídos; o Aumento en la sensibilidad de la piel a la luz del sol.

### INTERACCIONES:

No tome antiácidos que contienen calcio, magnesio o aluminio, medicina para úlcera, sucralfato, o suplementos vitamínicos o minerales que contienen hierro o zinc por un mínimo de 6 horas antes o 2 horas después de la dosis de Ciprofloxacino.

El efecto de un medicamento puede ser modificado por su administración junto con otros (interacciones), por esto, Ud. debe comunicar al Médico o Farmacéutico todos los medicamentos que está usando.

Se han descrito interacciones con los siguientes medicamentos: Didanosina; Teofilina; Warfarina; Probenecid; Insulina o un medicamento oral antidiabético como Glipizida, y otros; Fenitoína; o Ciclosporina

### CONTRAINDICACIONES:

La administración de Ciprofloxacino está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad a Ciprofloxacino u otros antibióticos quinolónicos. En pacientes con antecedentes de patología tendinosa asociada a la administración de quinolonas.

### EMBARAZO Y LACTANCIA:

No se recomienda su uso en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

Pediatría: esta medicina no es recomendada en infantes, niños o adolescentes, salvo expresa indicación médica.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Evite la exposición prolongada a la luz del sol. Ciprofloxacino puede aumentar la sensibilidad de su piel a la luz del sol y puede causar una quemadura de sol. Si la exposición al sol es inevitable, póngase ropa que lo proteja y use crema protectora del sol. Comuníquese con su médico si usted nota una quemadura grave, enrojecimiento, picazón, sarpullido, o hinchazón después de exponerse al sol.

Tenga cuidado al conducir, al operar maquinaria, o al hacer otras actividades peligrosas. Ciprofloxacino puede causar mareos. Si usted siente mareos, evite estas actividades.

Evite el consumo excesivo de productos que contienen cafeína. Ciprofloxacino puede aumentar los efectos de la cafeína.

Usted debe comunicar a su médico si sufre cualquier reacción alérgica a esta fluoroquinolona o a medicamentos relacionados como cinoxacina o ácido nalidixico

Si sufre de: Enfermedad del riñón; o Epilepsia o convulsiones. Quizás usted no pueda tomar Ciprofloxacino, o tal vez necesite una modificación en su dosis o control especial si tiene cualquiera de las condiciones mencionadas anteriormente.

Ciprofloxacino está clasificada por la FDA en la categoría C de Riesgos a la Gestación. Esto significa que no se sabe si Ciprofloxacino dañará al bebé no nato. No tome este medicamento sin antes consultar con su médico si está embarazada o podría quedar embarazada durante su tratamiento.

Ciprofloxacino pasa a la leche materna y puede afectar el desarrollo de los huesos del bebé que está amamantando. Si está dando de lactar al bebé, no tome este medicamento sin antes consultar con su médico.

Durante el tratamiento con quinolonas se han observado tendinitis y/o ruptura tendinosa (que afecta sobre todo al tendón de Aquiles). Estas reacciones se observaron especialmente en pacientes de edad avanzada y en aquellos tratados con corticosteroides. Por tanto, el tratamiento con Ciprofloxacino debe ser interrumpido y la extremidad afectada mantenida en reposo en caso de aparición de dolor o signos de inflamación. En caso de afectación del tendón de Aquiles, es prioritario evitar la ruptura de ambos tendones.

No deberá utilizarse Ciprofloxacino en niños y adolescentes en crecimiento excepto para las indicaciones incluidas en el inserto.

La colitis pseudomembranosa es una forma particular de enterocolitis que puede producirse con el uso de antibióticos (en muchos casos debido a Clostridium difficile). Si durante el tratamiento o tras el tratamiento se produce diarrea severa y persistente, deberá consultar con su médico. Si se sospecha de diarrea por Clostridium difficile, deberá suspenderse inmediatamente la administración de Ciprofloxacino y deberá administrarse un tratamiento adecuado. No deberán utilizarse fármacos depresores del peristaltismo.

La administración de Ciprofloxacino a pacientes con historia familiar y/o con déficit congénito de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa debe hacerse con precaución debido a que pueden sufrir crisis hemolíticas cuando reciben quinolonas.

### SOBREDOSIFICACIÓN:

Ante el evento de una sobredosis, el estómago debe ser vaciado por inducción de vómito o lavado gástrico.

### ALMACENAMIENTO:

Almacenar a menos de 30 °C protegido de la luz y la humedad.

Venta bajo receta médica

### PRESENTACIÓN:

Caja por 10 y 20 Comprimidos Recubiertos

Elaborado por: Pell Tech  
Health Care PVT. Ltd. India.

Para: LUYECK MEDICAL CORP.  
2797 NW 105th Avenue  
Miami, Florida, USA.



Si presenta alguna reacción adversa debido a este u otro medicamento de Luveck  
Repórtalo aquí: [www.luveck.com/farmacovigilancia](http://www.luveck.com/farmacovigilancia)