

Simperten®

Losartán Potásico 50 mg & 100 mg Bioequivalente

Composición:

Cada tableta recubierta contiene:
Losartán Potásico.....50 mg

Cada tableta recubierta contiene:
Losartán Potásico.....100 mg

INDICACIONES

SIMPERTEN® Tabletas se utiliza en el tratamiento de la hipertensión. Es efectivo cuando se utiliza solo o con otros medicamentos para la hipertensión, tales como diuréticos que ayudan al cuerpo a eliminar agua.

SIMPERTEN® Tabletas también se utiliza para disminuir el progreso de enfermedades renales causadas por diabetes tipo 2 (el tipo de diabetes que no requiere inyecciones de insulina). Es el primero de una nueva clase de medicamentos para la hipertensión llamados receptores antagonistas de angiotensina II. SIMPERTEN® Tabletas trabaja, en parte, previniendo que la hormona angiotensina II estreche los vasos sanguíneos, lo que tiende a aumentar la presión arterial.

El factor más importante de Simperfen

Usted deberá tomar SIMPERTEN® Tabletas regularmente para que sea efectivo. Debido a que la presión sanguínea declina gradualmente, es probable que pasen ciertas semanas antes de que se obtenga el beneficio total de SIMPERTEN® Tabletas, y usted deberá continuar tomándolas aun cuando se sienta bien. SIMPERTEN® Tabletas no cura la hipertensión; simplemente lo mantiene bajo control.

¿Cómo deberá tomar Simperfen?

SIMPERTEN® Tabletas puede tomarse con o sin comida.

Deberá tomarla todos los días a la misma hora. Por ejemplo, si usted se toma el medicamento en la mañana antes o después del desayuno, usted establecerá una rutina y será menos probable que olvide una dosis.

•Si usted olvida una dosis

Tómela tan pronto sea posible. Si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y regrese a su esquema regular.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se pueden anticipar los efectos secundarios. Si cualquier desarrollo o cambio es intenso, comuníquese al doctor tan pronto sea posible. Solo su doctor puede determinar si es seguro para usted que continúe tomando SIMPERTEN® Tabletas.

•En los efectos secundarios puede incluirse:

Tos, mareo, infección de las vías respiratorias superiores

Otros efectos secundarios, tales como debilidad y dolor de pecho, se han reportado por personas que toman SIMPERTEN® Tabletas en diabéticos con enfermedad renal. También es probable que ocurran reacciones alérgicas graves, incluyendo hinchazón de la cara y garganta.

CONTRAINDICACIONES

No se deberá de tomar SIMPERTEN® Tabletas cuando este embarazada. Evitarla si alguna vez ha tenido una reacción alérgica a ella.

Precauciones especiales sobre Losartán Potásico

SIMPERTEN® Tabletas pueden causar disminución de la presión arterial, especialmente si usted también está tomando diuréticos. Puede sentirse mareado o desmayarse, especialmente en los primeros días de tratamiento. Si ocurren estos síntomas, contacte a su doctor. Es probable que se necesite ajuste de dosis o discontinuación del medicamento. Asegúrese de conocer su reacción a SIMPERTEN® Tabletas antes de conducir u operar máquinas. Sudoración excesiva, deshidratación, diarrea severa, o vómito pueden hacer que usted pierda gran cantidad de agua, causando una caída severa de la presión sanguínea. Comuníquese con su doctor si usted experimenta cualquiera de los síntomas anteriores.

Asegúrese de decirle a su doctor sobre cualquier condición médica que tenga, especialmente de enfermedad renal o hepática e insuficiencia cardiaca congestiva. En casos muy raros, Losartán potásico ha provocado problemas fatales en el riñón en personas con insuficiencia cardiaca.

SIMPERTEN® Tabletas tiende a aumentar los niveles de potasio en la sangre. Revise con su doctor antes de tomar suplementos de potasio o utilizar una sal sustituta.

INTERACCIONES

Si SIMPERTEN® Tabletas se toma con ciertos fármacos, el efecto de cualquiera puede aumentar, disminuir, o alterarse. Es especialmente importante revisar con su doctor antes de tomar SIMPERTEN® Tabletas con lo siguiente:

Diuréticos que dejan potasio en el cuerpo, tal como Amilorida, Espironolactona, y Triamterano, Indometacina, Ketoconazol, Troleandomicina.

EMBARAZO Y LACTANCIA

Fármacos tal como Losartán Potásico pueden causar lesión o incluso la muerte al bebé no nacido cuando se utiliza en el segundo o tercer trimestre de embarazo. Pare de tomar Losartán Potásico tan pronto usted se entere que está embarazada. Si usted está embarazada o planea estarlo, comuníquese a su doctor antes de tomar Losartán Potásico. Losartán Potásico puede aparecer en la leche materna y puede afectar al lactante. Si el Losartán Potásico es esencial para su salud, su médico pueda que le indique dejar de lactar mientras usted toma SIMPERTEN® Tabletas.

DOSIS

ADULTOS: Presión Arterial Alta

La dosis usual de inicio es 50 mg una vez al día. Sin embargo, SIMPERTEN® Tabletas puede tomarse dos veces al día, con un rango de dosis total diarios de 25 mg a 100 mg. Si su presión arterial no responde dentro de 3 a 6 semanas, su doctor puede aumentar la dosis o agregar un diurético en dosis bajas a su régimen.

Para las personas que toman diuréticos y personas con problema hepático, la dosis usual de inicio es de 25 mg diarios. Su doctor puede ajustar la dosis de acuerdo a su respuesta.

Enfermedad renal causada por diabetes

La dosis usual de inicio es 50 mg una vez al día. El doctor puede aumentar la dosis a 100 mg una vez al día si la presión alta se mantiene.

NIÑOS

La seguridad y eficacia de SIMPERTEN® Tabletas no se ha estudiado en niños.

SOBREDOSIS

Cualquier medicamento tomado en exceso puede tener graves consecuencias. Si usted sospecha de una sobredosis, buscar atención médica inmediatamente. La información relacionada a sobredosis con SIMPERTEN® Tabletas es limitada. Sin embargo, hipotensión (baja presión arterial) y respiración rápida o lenta anormal pueden ser signos de una sobredosis.

ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar fresco, seco y protegido de la luz a menos de 30 °C. No use después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

PRESENTACIÓN

Caja por 30 tabletas

Elaborado por: Emil
Pharmaceutical Pvt. Ltd. India

Para: **LUVECK MEDICAL CORP.**
2797 NW 105th Ave.
Miami, Florida 33172, USA

