

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE

GRIFOPARKIN® COMPRIMIDOS

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:

GRIFOPARKIN	
Cada comprimido contiene:	
Levodopa	250 mg
Carbidopa (como monohidrato)	25 mg
Excipientes: colorante FD&C azul N° 2 lacado, almidón pregelatinizado, almidón de maíz, sodio almidón glicolato, magnesio estearato, celulosa microcristalina.	



Clasificación:

Antiparkinsoniano

1.- ¿Para qué se usa?

Se utiliza para el tratamiento del parkinson idiopático, postencefálico o aquel que puede seguir a lesión del sistema nervioso por monóxido de carbono o por manganeso.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: comenzar el tratamiento con 12.5 mg de carbidopa con 125 mg de levodopa 1 a 2 veces al día, aumentando 1/2 comprimido cada 1 a 2 días hasta obtener la dosis óptima que suele ser entre 70-100 mg de carbidopa que corresponden a 700-1000 mg de levodopa. La dosis máxima establecida es de 200 mg de carbidopa que corresponden a 2 g de levodopa en 24 horas.

- Consejo de cómo administrarlo

Es mejor no tomar el medicamento con el estómago vacío. En el caso que el medicamento le cause irritación estomacal, puede comer 15 minutos después de haber tomado el medicamento.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis. El uso por periodos prolongados puede provocar pérdida en la habilidad para moverse, la cual puede durar desde pocos minutos a varias horas.

3.- Precauciones:

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con levodopa - carbidopa.

- Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos como confusión o delirio.

- Manejo de vehículos

Asegúrese del efecto que tiene sobre usted este medicamento, antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe señalar a su médico que se encuentra embarazada o puede estarlo.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede causar efectos desconocidos en el niño, además disminuye el flujo de leche, por lo que debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento o de suprimir la lactancia.

Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra, ya que no existen estudios que avalen la seguridad de utilizar levodopa - carbidopa, en niños.

- Precauciones especiales

Antes de someterse a cualquier tipo de cirugía debe avisar a su médico o dentista que se encuentra en tratamiento con este medicamento.

Este medicamento puede causarle mareos o fatiga si cambia de posición bruscamente, por lo que se recomienda realizar los movimientos lentamente para evitar este malestar.

Debe evitar consumir vitamina B6 o consumir alimentos que tengan un alto contenido de esta vitamina como hígado, pescado, cereales completos, frijoles y lentejas.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a levodopa y/o carbidopa.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

Si usted padece de glaucoma de ángulo cerrado.

5.- Interacciones:

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: haloperidol, clorpromazina, promazina, tioridazida, fenitoina, isocarboxazida, piridoxina, selegilina.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de diabetes mellitus, enfisema pulmonar, asma, bronquitis, glaucoma, problemas hormonales, melanoma, alguna enfermedad mental, epilepsia, úlcera estomacal.

- Alimentos

Los alimentos ricos en vitamina B6 como paltas, porotos verdes, hígado, cerdo, tunas, etc., pueden provocar una disminución del efecto de levodopa.

Ingerir una dieta con alta cantidad de proteínas (carnes, huevos) puede disminuir la efectividad del medicamento.

- Exámenes de laboratorio

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6.- Efectos adversos:

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: depresión, cambios en el comportamiento, como agresividad, inusuales e incontrolables movimientos del cuerpo.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: ansiedad, confusión, nerviosismo, constipación, diarrea, sequedad de boca, dolor de cabeza, pérdida del apetito, problemas para dormir.

7.- Sobredosis:

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.- Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, humedad, a no más de 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico
No recomiende este medicamento a otra persona.**

Versión: 2
Rev. 07/2020

LUVECK MEDICAL CORP.
MIAMI, FLORIDA, USA



Si presenta alguna reacción adversa debido a este u otro medicamento de Luveck
Reportalo aquí: www.luveck.com/farmacovigilancia

120-30-13542-02